

# Broedresultaten van Ooievaars



Ooievaar, nest in dode kastanjeboom. De Schiphorst 1 april 2013. Foto: Wim van Nee.

In 2012 sloegen de werkgroep STORK en Sovon de handen ineen om de verzameling van nestgegevens van Ooievaars een nieuwe impuls te geven. We ontwikkelden, met steun van Vogelbescherming Nederland, een laagdrempelige invoermodule voor nesteigenaren, contactpersonen en beheerders van ooievaarsstations: [stork.sovon.nl](http://stork.sovon.nl). In wezen een variant-op-maat van Nestkaart Light.

Deze actie leverde in 2012-15 jaarlijks 200-400 nestkaarten op, vrij goed over het hele land verspreid (figuur 1). Dat is maar een deel van de Nederlandse broed-populatie, die in 2014 naar schatting 850-950 bezette nesten omvatte. De steekproef is echter voldoende groot om iets te kunnen zeggen over de recente broedresultaten.

## Eileg en nestsucces

De meeste Ooievaars starten in de eerste decade van april met de eileg. Het verschil in legbegin tussen het relatief koude 2013 en het extreem zachte 2014 zien we ook bij de Ooievaar terug (gemiddeld 13 april versus 6 april), al is het contrast wat minder groot dan bij veel andere soorten. Het jaar 2015 zat daar met een gemiddeld legbegin van 9 april tussenin.

Ruim driekwart van de nesten levert uitgevlogen jongen op. Dit zou wat overschat kunnen zijn, omdat mislukte nesten minder goed worden doorgegeven dan succesvolle nesten. Op basis van langjarig en intensief onderzoek aan de grote populatie rond Gorsseel, komen Jeroen Kuipers c.s. echter op een slagingskans van 70% (Jubileum

Jaarboek 2014 van VWG Zutphen e.o.). In dezelfde orde van grootte dus.

## Goede en slechte jaren

Gemiddeld worden per succesvol nest 2,0 jonge Ooievaars vliegvlug. Goede en slechte jaren verschillen enigszins tussen provincies, maar 2015 was over de gehele linie een productiever jaar dan 2014 (figuur 2). Voedsel en weer spelen ongetwijfeld mee. Zo is de Friese uitschieter in 2014 vermoedelijk te koppelen aan de hoge veldmuisdichtheden van dat voorjaar, die vooral (maar niet alleen!) in deze provincie in het oog sprongen. De Friese ooievaarsnesten in de dataset liggen aan de rand van het gebied in ZW-Friesland waar de aantallen Veldmuizen explodeerden (Limosa 88(2)). Extreme neerslag kan een ander deel van de variatie in broedsucces verklaren, zoals eind mei 2014 toen zeer zware buien Drenthe en Noord-Overijssel teisterden. Nestjongen kunnen dan onderkoeld raken, zeker als de ouders geen bescherming kunnen bieden en de waterafvoer in het nest slecht is. Dergelijke neerslaghoeveelheden bleven in 2013 en 2015 uit.

Al met al prachtig voer voor verder onderzoek naar achterliggende oorzaken van verschillen tussen jaren en gebieden.

## Groeimogelijkheden?


Met gemiddeld ongeveer 1,5 uitvliegend jong per broedpaar moet de Ooievaarpopulatie in Nederland ook de komende jaren nog kunnen doorgroeien. Dat wil zeggen: mits de overlevingscijfers, die masterstudent Marten Tacoma op basis van ringgegevens enkele jaren geleden berekende, nog steeds actueel zijn. Hij kwam uit op een overleving van ongeveer 85% voor volwassen vogels en 35% voor eerstejaars. Van een duidelijke afvlakking in de landelijke populatie-ontwikkeling is nog geen sprake ([sovon.nl/soort/1340](http://sovon.nl/soort/1340)).

## Nestgegevens doorgeven


Om de omvang en kwaliteit van de gegevensverzameling te verbeteren, roepen we iedereen op om nestgegevens van Ooievaars door te geven via [stork.sovon.nl](http://stork.sovon.nl). Tijdens het invoeren word je geattendeerd op reeds bij ons bekende nestlocaties, zodat gegevens

van verschillende waarnemers bij hetzelfde nest eenvoudig te combineren zijn.

We kunnen vooral nog nestgegevens gebruiken uit delen van het rivierengebied en rond Lelystad. Bovendien ontvangen we per nest graag meer waarnemingen per bezoekdatum. Dan kunnen de berekeningen van o.a. legbegin en broedsucces worden verbeterd en verder uitgesplitst. Zeker voor nesten waar een webcam bij staat is dat natuurlijk goed mogelijk. Geef ook consequent de gegevens door van mislukte broedgevallen, dus de nesten waar uiteindelijk geen jongen zijn uitgevlogen. Die zijn net zo belangrijk als de succesvolle nesten! Tenslotte willen we het bestand met historische nestgegevens toegankelijk maken. Daarvoor zijn we op zoek naar een student die ons met het overzetten kan helpen, en vervolgens een analyse kan uitvoeren van veranderingen in broedprestaties in de afgelopen decennia.



Figuur 1. Ooievaar. Verspreiding van nestgegevens in 2012-15.



Figuur 2. Ooievaar. Gemiddeld aantal vliegvlugge jonge per succesvol nest, uitgesplitst naar jaar en provincie.

● **Chris van Turnhout (Sovon),  
Annemieke Enters  
& Wim van Nee (STORK)**